



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ VASLUI
Strada Republicii, Bl 367, sc. E & F , VASLUI,
Telefon 0235 / 312455 Fax 0235 / 317351
e-mail:secretariat@dspvs.ro

Nr. 9473 /05.05.2022

COMUNICAT DE PRESĂ
RECOMANDĂRI PRIVIND MUȘCĂTURA DE CĂPUŞĂ

Încălzirea vremii favorizează apariția și răspândirea căpușelor și, implicit, a bolilor transmise de aceste artropode. Astfel, Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui dorește să atragă atenția cetățenilor asupra riscului, precum și asupra modalităților de evitare a acestor infecții.

O parte din căpușe nu transmit boli și nici nu determină apariția unor probleme grave de sănătate gazdei, altele însă, reprezintă principalul vector al meningitei cu *Borrelia burgdorferi* – boala Lyme.

Boala Lyme se manifestă prin eruptie cutanată roșiatică, de formă circulară, aparută în jurul mușcăturii, dureri musculare și articulare, febră, frisoane, inflamarea ganglionilor limfatici, iar simptomele apar de obicei la 30 de zile de la momentul mușcăturii.

De la începutul anului 2022, la nivelul județului Vaslui a fost înregistrat un singur caz de borelioză.

Având în vedere că activitățile în aer liber sunt din ce în ce mai frecvente, crescând astfel și riscul mușcăturilor de căpușe, Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui recomandă populației următoarele:

Măsuri protective pentru om:

- evitarea zonelor cu iarbă înaltă, arbuști, păduri, în care expunerea la căpușe este foarte mare;
- în situația expunerii purtarea unor haine deschise la culoare, pantaloni lunghi introduși în șosete de culoare deschisă, pantofi deschiși la culoare, fără orificii sau decupaje;
- inspectarea corpului cu atenție și înlăturarea căpușelor nefixate pe piele;
- în situația în care s-au identificat capușe fixate pe suprafața corpului, se recomandă prezentarea la medic pentru a putea fi îndepărtate, reducându-se astfel riscul apariției unor reacții inflamatorii tegumentare, dar și riscul de transmitere a unor boli infecțioase. De asemenea, se recomandă prezentarea de urgență la medicul specialist;
- în cazul expunerii profesionale se recomandă purtarea echipamentului de protecție, instruire privind simptomatologia bolii și modalitățile de prevenire.

Măsuri privind zonele favorabile dezvoltării căpușelor:

- tăierea vegetației înalte (ierburi, tufișuri), tunderea gazonului, îndepărtarea/arderea frunzelor uscate, înlăturarea vegetației din vecinătatea sau de pe pereții caselor;

- controlul animalelor-gazdă: distrugerea/îndepărarea rozătoarelor prin depozitarea corectă a gunoiului menajer, deratizare preventivă în focar, tratarea animalelor de companie și a celor domestice (oi, capre, vaci, cai și păsări de curte) cu acaricide adecvate, dezinsectia adăposturilor de animale, conform indicațiilor medicului veterinar;
- controlul chimic cu acaricide al populațiilor de căpușe, prin pulverizare pe zone restrânse (curți, verande, terase, pereti caselor) și pe zone cu vegetație propice dezvoltării căpușelor (parcuri, garduri vii, spații de joacă pentru copii, etc).

Mușcătura de căpușă în sine, nu este periculoasă, dar există riscul transmiterii unor infecții în sânge atunci când se hrănesc și să provoace boli grave. Riscul de infecție este mai mic dacă este detectată și îndepărtată imediat.



Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Întocmit: Popescu Roxana Elena	Biolog	05.05.2022	