



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ VASLUI

Strada Republicii, Bl 367, sc. E & F , VASLUI,

Telefon 0235 / 312455 Fax 0235 / 317351

e-mail:secretariat@dspvs.ro

Nr. 16337 /11.08.2022

INFORMARE

Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui vine în sprijinul cetățenilor cu informații privind modalitatea distribuirii în scop preventiv a iodurii de potasiu către populație, conform O.M.S nr. 1648/21 iunie 2022, comprimatele vor fi distribuite, prin intermediul farmaciilor comunitare.

Lista farmaciilor comunitare din județul Vaslui care eliberează comprimate iodură de potasiu 65 mg:

BÂRLAD	Dr. MAX	Piața Victoriei, Nr.5, Bl. C2
VASLUI	Dr. MAX	Strada Ștefan cel Mare, Nr. 89, Bl. T2, parter
VASLUI	Dr. MAX	Strada Decebal, Nr. 44, Kaufland
BÂRLAD	CATENA FARMACIE	Str. Vasile Lupu, Nr. 12, Bl. 4, Sc. B, parter
HUŞI	CATENA FARMACIE	B-dul 1 Mai, Nr. 2, Bl 20, Sc. D, parter
NEGREȘTI	CATENA FARMACIE	Str. Mihail Kogălniceanu, Bl. C3, parter
VASLUI	CATENA FARMACIE	Str. Republicii, nr. 367, Sc. C, Ap. 4, parter
VASLUI	CATENA FARMACIE	Str. Traian, Bl. 280, Sc. A, parter
VASLUI	CATENA FARMACIE	Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 35
VASLUI	CATENA FARMACIE	Str. Ing. Badea Romeo, Bl. 80, Sc. C, parter
VASLUI	CATENA FARMACIE	Str. Ștefan cel Mare, Bl. 104, parter

Medicul de familie, începând cu prima consultație acordată, inclusiv pentru consultațiile programate, eliberează, ca măsură strict preventivă, prescripția medicală pentru ridicarea din farmacia comunitară a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate pentru pacient, dacă acesta este eligibil.

Medicii de familie prescriu o singură dată comprimatele de iodură de potasiu 65 mg pacienților eligibili aflați în evidență proprie, precum și pacienților eligibili care nu au medic de familie, utilizând formularul de rețetă simplă tip PRF. Pentru pacientul minor, respectiv pentru pacientul lipsit de discernământ, medicul de familie eliberează reprezentantului legal al acestuia prescripția medicală pe numele pacientului minor, respectiv al pacientului lipsit de discernământ.

Persoanele care nu au medic de familie, respectiv reprezentanții legali ai minorilor ori persoanelor lipsite de discernământ care nu au medic de familie se pot prezenta la orice cabinet de medic de familie și completează, în vederea obținerii prescripției, declarația pe propria răspundere, în fața medicului de familie.

În cazul pierderii prescripției medicale, medicul de familie eliberează un duplicat, la solicitarea scrisă a pacientului pe numele căruia a fost eliberată prima prescripție medicală sau a reprezentantului legal, în cazul pacientului minor ori lipsit de discernământ, după caz, menționându-se distinct pe formular „duplicat”.

Prevederile prezentului ordin se aplică și pacienților străini și apatrizi care, potrivit actelor normative în vigoare, au dreptul la medicamente și/sau servicii medicale în România.

Farmaciile din lista prevăzută eliberează medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate în mod gratuit, exclusiv în baza prescripției medicale emise de medicul de familie în formatul original. Odată cu medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate, farmaciile pun la dispoziția pacientului sau a aparținătorului, respectiv persoanei care ridică medicamentul în numele pacientului și informațiile privind modul de administrare, conform *Fișei informative pentru pacienți* cu privire la medicamentul iodură de potasiu 65 mg comprimate.

Important!

Iodura de potasiu de 65 mg se va administra numai la indicațiile autorităților și doar în caz de eveniment sau incident nuclear!

Metodele de informare ale autorităților în caz de accident nuclear se vor face prin intermediul radio, TV, mass media sau/și chiar prin intermediul sirenelor de protecție civilă.

În scopul de a realiza blocarea eficace a absorbției radioactive, iodura de potasiu trebuie să fie administrată cât mai curând posibil după expunerea la radiații. În cazul în care administrarea are loc la 4-6 ore după expunere, absorbția este blocată doar în proporție de aproximativ 50%. În cazul în care administrarea de iodură de potasiu are loc mai târziu de 12 ore după expunere, absorbția acesteia nu mai este semnificativă, deoarece iodul radioactiv a fost absorbit deja de către glanda tiroidă.

Durata tratamentului este limitată la o *doză unică* care va fi administrată sub controlul autorităților competente. Această doză va oferi protecție pentru o expunere de până la 24 ore.

În cazul continuării expunerii la radiații radioactive, poate fi necesară administrarea unei noi doze în decursul a două zile.

Pentru copii sub 3 ani, farmaciile vor distribui un comprimat de iodură de potasiu de 65 mg, urmând ca aparținătorul minorului să dividă comprimatul în conformitate cu modul de administrare.

Beneficiul potențial al profilaxiei cu iod este cu atât mai mare cu cât vîrstă este mai mică.

Riscul de cancer tiroidian per unitate de doză de iod radioactiv este mai mare la făt, nou-născut și sugar decât la adult.

Populația-țintă pentru administrarea iodului este reprezentată cu vîrstă *sub 40 de ani*.

Atenționări speciale:

- Trebuie luat în considerare raportul beneficiu/risc al administrării iodurii de potasiu pentru fiecare grupă de vîrstă. Femeile gravide, femeile care alăptează, nou-născuții, sugarii și copiii trebuie tratați primii.

- Nou-născuții în primele zile de viață prezintă un risc deosebit în cazul expunerii la iod radioactiv și de inhibare a funcției tiroidiene prin supraîncărcare cu iodură de potasiu. Proporția captării iodului radioactiv este de 4 ori mai mare decât la alte grupe de vârstă. Hipotiroidismul tranzitoriu în această etapă precoce de dezvoltare a creierului poate determina pierderea capacitații intelectuale.


- La gravide, în cazul unui eveniment sau incident nuclear, utilizarea iodurii de potasiu în doza recomandată o perioadă scurtă de timp ca inhibitor tiroidian este necesară pentru păstrarea funcției tiroidiene a mamei și, începând din al doilea trimestru de sarcină, a fătului. Nu se administrează mai mult de două doze femeilor gravide. În timpul celui de al treilea trimestru de sarcină, o doză mare de iod poate determina inhibarea funcției tiroidiene a fătului, cu apariția gușei. În cazul administrării iodului femeilor gravide sunt necesare monitorizarea ecocardiografică a fătului până la sfârșitul sarcinii și screening de rutină în perioada neonatală. La gravidele cu hipertiroidism nu trebuie să se administreze iodură de potasiu din cauza inhibiției tiroidei la făt.

- Iodura se elimină în lapte. Tratamentul mamelor care alăpteză trebuie să fie cât mai scurt posibil, în general, nedepășind două doze. Nu se recomandă întreruperea alăptării.

- Prezintă risc pacienții cu tireotoxicoză tratați medicamentos sau pacienții cu antecedente de tireotoxicoză tratați medicamentos cărora li s-a întrerupt tratamentul și se află în stare de remisiune aparentă.

- Hipertiroidismul indus de iod poate fi precipitat la pacienții cu gușă nodulară asimptomatică sau boală Graves latentă, cărora nu li se administrează tratament.

- Nu se recomandă profilaxia cu iodură de potasiu persoanelor cu vârstă de peste 40 de ani. Riscul de cancer tiroidian este foarte mic la această grupă de vârstă, în timp ce incidența afectării tiroidiene este mai mare. Ca urmare, riscul de complicații tiroidiene induse de iod este mai mare la această grupă de vârstă.



Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat: Dr. Costache Luminița	Medic Șef	11. AUG. 2022	
Întocmit: Dr. Aciobăniței Andreea-Georgiana	Medic Stomatolog	11. AUG. 2022	